



健康で豊かな国民生活を保健医療福祉情報システムが支えます

JAHIS実証実験2016 説明資料 オーダ情報(処方) 実施情報(処方)

JAHISデータ互換性専門委員会

処方データ交換規約Ver.3.0Cの改版内容の検証

1. JAMI標準用法規格を使用した隔日、曜日指定、不均等投与等の表現
2. 新しいJHSP表とRXE-7でのコメント表現
3. 処方実施情報のエクスポート・インポート

処方データ交換規約Ver.3.0Cにおける主な変更点

- (1) 「JAHIS データ交換規約 共通編 Ver.1.1」との整合
- (2) JAMI標準用法規格における拡張部分の取り込み
- (3) 処方実施メッセージの追加
- (4) 在宅自己注射への対応
- (5) 持参薬処方への対応
- (6) JHSP表の追加
 - JHSP表0005 1日の中での服用開始タイミング
 - JHSP表0006 服用実施タイミング
 - JHSP表0007 処方区分
- (7) 【処方せんコメント】、【薬品コメント】、不均等投与 をセットするフィールドの変更
RXE-21 ⇒ RXE-7


カテゴリ	基本データセット項目		HL7対応		
	項目名	項目名(英語)	データタイプ	OPT	セグメントNO
オーダ共通情報	医療機関ID	Facility ID	XON	0	ORC-21
	患者ID	Patient ID	CX	R	PID-3
	オーダ番号	Placer Order Number	EI	C	ORC-2 ORC-4
	版数(オーダ番号)	Revision (Placer Order Number)	EI	0	
	入外区分	Order Type	CWE	0	ORC-29
	依頼科	Entering Organization	CWE	0	ORC-17
	依頼医	Ordering Provider	XCN	0	ORC-12
	更新日時	Update Date/Time	TS	0	ORC-9
	更新者	Update User	XCN	0	ORC-19
	端末ID	Entering Device	CWE	0	ORC-18
	ステータス	Order Status	ID	R	ORC-1
管理情報	処方種別	Recipe	CWE	0	RXE-21
	処方せん番号	Prescription Number	ST	C	RXE-15
	オーダ受付日時	Order Effective Date/Time	TS	0	ORC-15
	処方せんコメント	Recipe Comment	CWE	0	RXE-7
	麻薬施用者番号	Provider's Narcotic License Number	XCN	0	RXE-13
保険情報	保険種別	Insurance Plan	CWE	R	IN1-2

カテゴリ	基本データセット項目		HL7対応		
	項目名	項目名(英語)	データタイプ	OPT	セグメントNO
用法指示情報	Rp番号	Rp Number	EI	0	ORC-4
	用法種別	Usage	CWE	0	RXE-27
	用法	Usage Code	RPT	0	TQ1-3
	投薬開始日時	Start Date/Time	TS	0	TQ1-7
	日数	Duration Component	CQ	0	TQ1-6
	回数		NM	0	TQ1-14
	経路	Route	CWE	R	RXR-1
	部位	Site/Modifire	CWE	0	RXR-2 RXR-6
	用法コメント	Usage Comment	TX	0	TQ1-11
薬品指示情報	薬品	Give Code	CWE	R	RXE-2
	用量(1回量)	Give Amount	NM	R	RXE-3
	用量(1回量-最大)	Give Amount - Maximum	NM	0	RXE-4
	用量(1日量)	Total Daily Dose	CQ	C	RXE-19
	用量単位	Give Units	CWE	R	RXE-5
	総量	Dispense Amount	NM	C	RXE-10
	総量単位	Dispense Units	CWE	C	RXE-11
	薬品コメント	Dispense Comment	CWE	0	RXE-7

◆使用セグメント

MSH	メッセージヘッダー
[	
PID	患者ID
[[IN1]]	保険
]	
{	
ORC	共通オーダ
RXE	薬剤／処置
{ TQ1 }	タイミング／数量
{ RXR }	薬剤／処置経路
}	

※MSH-9にはRDE^O11^ RDE_O11を使用する



基本データセット項目(実施情報)

カテゴリ	基本データセット項目		HL7対応		
	項目名	項目名(英語)	データタイプ	OPT	セグメントNO
共通情報	医療機関ID	Facility ID	XON	0	ORC-21
	患者ID	Patient ID	CX	R	PID-3
	オーダ番号	Placer Order Number	EI	C	ORC-2
	版数(オーダ番号)	Revision (Placer Order Number)	EI	0	ORC-4
	入外区分	Order Type	CWE	0	ORC-29
	依頼科	Entering Organization	CWE	0	ORC-17
	依頼医	Ordering Provider	XCN	0	ORC-12
	更新日時	Update Date/Time	TS	0	ORC-9
	更新者	Update User	XCN	0	ORC-19
	端末ID	Entering Device	CWE	0	ORC-18
	ステータス	Order Status	ID	R	ORC-1
実施用法情報	Rp番号	Rp Number	EI	0	ORC-4
	実施投与経路	Route	CWE	R	RXR-1
	実施投与部位	Site/Modifire	CWE	0	RXR-2、RXR-6
	実施コメント	Usage Comment	CWE	0	RXA-9
	実施開始日時	Start Date/Time	TS	R	RXA-3
	実施終了日時	End Date/Time	TS	0	RXA-4
	実施タイミング		CWE	0	RXA-9
	実施者	Administering Provider	XCN	0	RXA-10
	実施場所	Administered-at Location	LA2	C	RXA-11
	実施進捗	Adminstration Progress	ID	0	RXA-20
実施薬剤情報	実施投薬剤	Administered Medicine	CWE	R	RXA-5
	実施投薬量	Administered Medicine Amount	NM	R	RXA-6
	実施投薬量単位	Administered Medicine Units	CWE	C	RXA-7

◆使用セグメント

MSH	メッセージヘッダー
[	
PID	患者ID
]	
{	
ORC	共通オーダ
{	
{ RXA }	薬剤／処置投薬
RXR	薬剤／処置経路
}	
}	

※MSH-9にはRAS^O17^RAS_O17を使用する

【シナリオ 1】 服用開始タイミングのある処方依頼

入院処方 曜日指定 服用開始タイミングあり 1Rp 薬品数は任意

例)	Rp.1	プレドニン錠5mg	1回1錠 (1日3錠)
		ボルタレン錠 25mg	1回1錠 (1日3錠)
		1日3回朝昼夕食後	8日分
		月曜日、木曜日	
		2回目(昼)から服用開始	

【シナリオ1】 服用開始タイミングのある処方依頼

```
MSH|^~\&|SEND||RECEIVE||20160821161523||RDE^011^RDE_011|1|P|2.5|||||~ISO IR87||ISO 2022-1994<CR>
PID|||1000000001^^^^PI||患者^太郎^^^^L^I~カンジャ^タロウ^^^^L^P||19601224|M<CR>
IN1|1|06^組合管掌健康保険^JHSD0001|""<CR>
ORC|NW|12345678||12345678_01|||||20160821161501||||10001^実証^一郎^^^^^^L^^^^I~ジッショウ^イチロウ
^^^^^^L^^^^P|||||01^内科^99Z01|PC0001^^99ZWS||||||||I^入院患者オーダ^HL70482<CR>
RXE||105271807^プレドニン錠 5 m g^HOT|1||TAB^錠^MR9P||02^02回目から服用^JHSP0005|||8|TAB^錠^MR9P||||||3^TAB&
錠^MR9P||IHP^入院処方^MR9P~ORD^定期処方^MR9P|||||21^内服^JHSP0003<CR>
TQ1|||10130444000000000&内服・経口・1日3回朝昼夕食後&JAMISDP01~W0100100&月曜日・木曜日&JAMISDP01|||8^D&日
&ISO+|20160908<CR>
RXR|PO^口^HL70162<CR>
ORC|NW|12345678||12345678_01|||||20160821161501||||10001^実証^一郎^^^^^^L^^^^I~ジッショウ^イチロウ
^^^^^^L^^^^P|||||01^内科^99Z01|PC0001^^99ZWS||||||||I^入院患者オーダ^HL70482<CR>
RXE||100795402^ボルタレン錠 2 5 m g^HOT|1||TAB^錠^MR9P||02^02回目から服用^JHSP0005|||8|TAB^錠
^MR9P||||||3^TAB&錠^MR9P||IHP^入院処方^MR9P~ORD^定期処方^MR9P|||||21^内服^JHSP0003<CR>
TQ1|||10130444000000000&内服・経口・1日3回朝昼夕食後&JAMISDP01~W0100100&月曜日・木曜日&JAMISDP01|||8^D&日
&ISO+|20160908<CR>
RXR|PO^口^HL70162<CR>
<EOM>
```

【シナリオ2】 隔日×不均等

外来院外 内服 1RP 1薬品 隔日×不均等用法

各種コメントあり

(処方せんコメント、薬品コメント、用法コメントのいずれか一つを含む)

例)	Rp.1	プレドニン錠5mg	4－2－1(1日7錠)
		1日3回朝昼夕食後	7日分
		1日おき	

後発医薬品変更不可……………＜薬品コメント＞

服用・使用方法を患者に詳しく説明…＜処方せんコメント＞

【シナリオ2】 隔日×不均等

```
MSH|^~\&|SEND||RECEIVE||20150821161523||RDE^011^RDE_011|201508211615230143|P|2.5|||
||~ISO IR87||ISO 2022-1994<CR>
PID|||1000000001^^^^PI||患者^太郎^^^^L^I~カンジャ^タロウ^^^^L^P||19601224|M<CR>
IN1|1|06^組合管掌健康保険^JHSD0001|""<CR>
ORC|NW|123456789020000_01||123456789020000_01_01|||||20151007101523|||10001^実証^一
郎^^^^^^L^^^^^I~^ジッショウ^イチロウ^^^^^^L^^^^^P|||20151007102536||01^内科^9
9Z01|PC000001^^99ZWS|10001^実証^一郎^^^^^^L^^^^^I~^ジッショウ^イチロウ^^^^^^L
^^^^^P||^FI^^9123456789||||||I^入院患者オーダ^HL70482<CR>
RXE||105271807^プレドニン錠 5 m g^HOT|1|4|TAB^錠^MR9P||V14NNNNN^4錠^JAMISDP01~V22N
NNNN^2錠^JAMISDP01~V31NNNNN^1錠^JAMISDP01^^服用・使用方法を患者に詳しく説明^J
HSIOB0032^^後発医薬品変更不可^JHSIOB0031|||49|TAB^錠^MR9P|||||||7^TAB&錠&MR9P|
|OHP^外来処方^MR9P~OHI^院内処方^MR9P|||||21^内服薬^JHSP0003<CR>
TQ1|||10130444000000000&内服・経口・1日3回朝昼夕食後&JAMISDP01~I1100000&隔日&JAMIS
DP01|||7^D&日&ISO+|20150825<CR>
RXR|P0^口^HL70162<CR>
<EOM>
```

【シナリオ3】在宅自己注射

外来院内・在宅自己注射・1RP1薬品

患者ID:1500000002

患者氏名:患者 一郎(男性 1945年2月2日)

オーダー更新日:2015年10月10日

外来処方 オーダー内容(院内処方)

Rp.1 アドベイト静注用250 50単位(1日50単位)

1日1回朝食直前

投薬開始日:2015年10月11日

投与期間:30日分

依頼医:実証 四郎

医師ID:100004

【シナリオ3】在宅自己注射

```
MSH|^~\&|SEND||RECEIVE||20151010161523||RDE^011^RDE_011|201510101615230143|P|2
.5|||||~ISO IR87||ISO 2022-1994<CR>
PID|||1500000002^^^^PI||患者^一郎^^^^L^I~カンジャ^イチロウ
^^^^L^P||19450202|M<CR>
IN1|1|06^組合管掌健康保険^JHSD0001|""<CR>
ORC|NW|12345678||12345678_01|||||20151010|||100004^実証^四郎^^^^^L^^^^I^^ジ
ッショウ^シロウ^^^^^^L^^^^P|||||01^内科^99Z01|||||||||0^外来患者オーダ
^HL70482<CR>
RXE||117697101^アドベイト 静注用250 / mL ^HOT|50||UNT^単位^MR9P|INJ^注射剤
^MR9P||||1500|UNT^単位^MR9P||||||50^UNT&単位&MR9P||0HP^外来処方^MR9P~OH0^
院外処方^MR9P|||||24^自己注射^JHSP0003<CR>
TQ1|||3011000400000014&注射・静脈注射・1日1回朝食後・ワンショット・在宅・自
己&JAMISDP01|||30^D&日&ISO+|20151011<CR>
RXR|IV^静脈^HL70162<CR>
<EOM>
```

【シナリオ4】 服用実施タイミングのある処方実施 (シナリオ1 に対する実施)

服用実施タイミングあり

例)	Rp.1	プレドニン錠5mg	1回1錠 (1日3錠)
		ボルタレン錠 25mg	1回1錠 (1日3錠)
		2回目(昼)に服用	

【シナリオ4】 服用実施タイミングのある処方実施 (シナリオ1 に対する実施)

```
MSH|^~&|SEND||RECEIVE||20160908140343||RAS^017^RAS_017|2|P|2.5|||||~ISO IR87||ISO 2022-1994<CR>

PID|||1000000001^^^^PI||患者^太郎^^^^L^I^カンジャ^タロウ^^^^L^P||19601224|M<CR>

ORC|NW|12345678||12345678_01|||||20160908140343|||10001^実証^一郎^^^^^^L^^^^^I^ジッショウ^イチロウ^^^^^^L^^^^^P|||||01^内科^99Z01|PC0001^^99ZWS|||||||||I^入院患者オーダ^HL70482<CR>

RXA|0|1|201609081330|201609081330|105271807^プレドニン錠 5 m g ^HOT|1|TAB^錠
^MR9P||2016090802^2016年09月08日の02回目^JHSP0006|10001^実証^一郎^^^^^^L^^^^^I
|031^01^1^^^N|||||||CP<CR>

RXA|0|1|201609081330|201609081330|100795402^ボルタレン錠 2 5 m g ^HOT|1|TAB^錠
^MR9P||2016090802^2016年09月08日の02回目^JHSP0006|10001^実証^一郎^^^^^^L^^^^^I
|031^01^1^^^N|||||||CP<CR>

RXR|P0^口^HL70162<CR>

<EOM>
```

【シナリオ共通】

・用法コード

用法コードにはJAMI標準用法規格を使用する。

「使用者定義表0335 繰り返しパターン」は本実験では使用しない。

JAMI標準用法規格とローカルコードを併記する場合には、JAMI標準用法規格とローカルコードが必ず1対1になるようにセットする。

・補足用法コード

曜日指定、日付間隔指定、不均等にはJAMI標準用法規格の補足用法コードを使用する。

補足用法における名称の表記方法は厳密に規定されていないため、表記のゆれは許容することとする。ただし、判読しやすい表記にしてください。

表記揺れの例

【曜日指定】	「月曜日・木曜日」「月曜日、木曜日に服用」など
【日付間隔指定】	「1日おき」「隔日」など
【不均等】	「1」「1錠」「朝1」「朝1錠」など

【シナリオ共通】

・日数、回数の扱い

TQ1-6 には投与実日数のみをセットし、TQ1-14に回数をセットする。

※投与実日数について

投与実日数は、実際に服用する日数とする。

服用開始タイミングによる日跨りや休薬期間による日数は考慮しない。

例) 1日3回朝昼夕食後 3日分
2回目(昼)から服用開始

⇒ 服用期間としては「4日」とカウントすることもできるが、
投与実日数としては「3日」をセットする

・TQ1-6の第2成分にコーディングシステム名をセットする。

例) 2^D&日&ISO+

【シナリオ共通】

- ・以下のJHSP表の各種フラグは出力してもよいが、審査対象外とする。
JHSP表0001 依頼者の処方指示
JHSP表0002 調剤特別指示
- ・下記フィールドについては、時刻までセットできない場合には日付のみでもよい。
TQ1-7(投薬開始日時)
RXA-3(実施開始日時)
RXA-4(実施終了日時)
- ・RXRセグメント
RXR-1(経路)は必須とする。
RXR-2、RXR-6(部位)は出力してもよいが、審査対象外とする。
- ・1日の中での服用開始タイミング
シナリオ1では「1日の中での服用開始タイミング」(RXE-7)は必須とする。
シナリオ2、3では出力してもよいが、審査対象外とする。

【シナリオ1】 服用開始タイミングのある処方依頼

・曜日指定

用法「曜日指定」はJAMI標準用法規格の補足用法コード(8桁)で表現し、指定する曜日は1つ以上の任意とする。

例) 10130444000000000&内服・経口・1日3回朝昼夕食後
&JAMISDP01~W0100100&月曜日・木曜日&JAMISDP01

・服用開始タイミング

服用開始タイミングは JHSP表0006 1日の中での服用開始タイミング でRXE-7に表現する。

例) 02^02回目から服用^JHSP0005

服用開始タイミングを明示しない場合は、「NS^指定なし^JHSP0005」をセットすること。
服用開始タイミングが不明な場合は、「U^不明^JHSP0005」をセットし、服用開始タイミングを明示しない場合と区別すること。

【シナリオ2】 隔日×不均等

・不均等投与の設定

RXE-7にセットする。(これまではRXE-21)

JAMI標準用法規格の補足用法コード(8桁)を使用し、1日の服用タイミング分だけ補足用法コードを繰り返す。

これまで使用していたMERIT-9の定義 (DVD^a-b-c-d^{MR9P})は出力してもよいが、審査対象外とする。

例) 朝1錠、夕2錠の場合

V11NNNN^{1錠}JAMISDP01~V22NNNN^{2錠}JAMISDP01

【シナリオ2】 隔日×不均等

・用法「隔日」の設定

JAMI標準用法規格の補足用法コード(8桁)を使用する。

これまで使用していたHL7マスタ(HL7 0335表)は使用しない。

例) 10110004000000000&内服・経口・1日1回夕食後&JAMISDP01~I11000000&隔日&JAMISDP01

「隔日」をエクスポートするときには用法として扱い、必ず、TQ1-3にセットしてください。システム上、コメントなどで管理していてもかまいませんが、コメントなどでインポートする場合にはその旨をポリシーシートに記載してください。

【シナリオ2】 隔日×不均等

・TQ1-6にセットする値

TQ1-6には、休薬期間は含まず、投与実日数をセットする。

データシートには投与実日数を申請し、エクスポートデータは投与実日数を出力してください。

システム上、投与実日数以外で管理している場合には投与日数の管理方法をポリシーシートに記載してください。

例)	Rp.1	プレドニン錠5mg	4-2-1(1日7錠)
		1日3回朝昼夕食後	7日分(投与実日数)
		1日おき	

⇒上記のような場合、投与実日数「7日」をTQ1-6にセットする

【シナリオ3】在宅自己注射

- ・一回量

一回量はRXE-3にセットする。

- ・総量

総量(調剤量)はRXE-10にセットする。

- ・一日量

一日量はRXE-19に表現する。

例) 50^UNT&単位&MR9P

- ・用法種別

JHSP表0003 用法種別 の「24:自己注射」使用して、
用法種別をRXE-27に表現する。

例) 24^自己注射^JHSP0003

【シナリオ3】在宅自己注射

・用法

JAMI標準用法規格を利用して、用法をTQ1-3に表現する。

コードの15桁目に「1:ワンショット」「2:点滴」、

16桁目に「4:在宅・自己」をセットする。

例) 32110002000000014&注射・皮下注射・1日1回朝食直前・
ワンショット・在宅・自己&JAMISDP01

・経路

HL7 0162表を利用して、経路をRXR-1に表現する。

例) SC^皮下^HL70162

【シナリオ4】 服用実施タイミングのある処方実施 (シナリオ1 に対する実施)

・服用実施タイミング

服用実施タイミングは JHSP表0006 服用実施タイミング でRXA-9に表現する。

例) 2016090802^2016年09月08日の02回目^JHSP0006

JHSD表0001 保険種別

コード	保険種別
C0	国民健康保険
01	協会管掌健康保険
06	組合管掌健康保険
31	国家公務員共済組合
32	地方公務員等共済組合
33	警察共済組合
34	学校共済組合
LI	労災
TI	自賠
PS	公務員災害
PI	公害医療
OE	自費(保険なし)

HL7表0482 オーダタイプ

コード	投薬経路
I	入院患者オーダ
O	外来患者オーダ

与薬単位 (MERIT-9 表4)

コード	単位
TAB	錠
CAP	カプセル
G	グラム
MG	ミリグラム
MCG	マイクログラム
L	リットル
ML	ミリリットル
UNT	単位
AMP	アンプル
BAG	袋
BTL	瓶
HON	本
KO	個
PCK	包
SHT	枚
VIL	バイアル

処方区分 (MERIT-9 表7)

コード	処方区分
OHP	外来処方
OHI	院内処方
OHO	院外処方
IHP	入院処方
DCG	退院処方
ORD	定期処方
XTR	臨時処方

使用者定義表0162 投薬経路

コード	投薬経路
IP	腹腔内
IV	静脈内
PO	口
SC	皮下

JHSP表0003 用法種別

コード	用法種別
21	内服
22	頓用
23	外用
24	自己注射

JHSP表0005

1日の中での服用開始タイミング

コード	服用開始タイミング
NN	NN回目から服用
NS	指定なし
U	不明

JHSP表0006 服用実施タイミング

コード	服用開始タイミング
YYYYMMDDNN	YYYY年MM月DD日のNN回目

薬品マスタ（HOT9）

薬品名	HOTコード
パンスポリンT錠100 100mg	110926901
ボルタレン錠 25mg	100795402
ブレドニン錠5mg	105271807
アムロジンOD錠5mg	117316101
リハロ錠1mg	115683602
フロモックス錠100mg	110937501
メジコン錠15mg	103745601
ムコソルバン錠15mg	103895802
ペルマックス錠50μg	101230902

内服用法（JAMI標準用法規格）

用法		コード
1日1回	内服・経口・1日1回朝食前	1011000100000000
	内服・経口・1日1回朝食後	1011000400000000
	内服・経口・1日1回夕食前	1011010000000000
	内服・経口・1日1回夕食後	1011040000000000
	内服・経口・1日1回就寝前	1011100000000000
1日2回	内服・経口・1日2回朝夕食前	1012010100000000
	内服・経口・1日2回朝夕食後	1012040400000000
	内服・経口・1日2回朝昼食前	1012001100000000
	内服・経口・1日2回朝昼食後	1012004400000000
	内服・経口・1日2回昼夕食前	1012011000000000
	内服・経口・1日2回昼夕食後	1012044000000000
1日3回	内服・経口・1日3回朝昼夕食前	1013011100000000
	内服・経口・1日3回朝昼夕食後	1013044400000000
	内服・経口・1日3回朝昼食前と就寝前	1013101100000000
	内服・経口・1日3回朝昼食後と就寝前	1013104400000000
	内服・経口・1日3回朝夕食前と就寝前	1013110100000000
	内服・経口・1日3回朝夕食後と就寝前	1013140400000000
	内服・経口・1日3回昼夕食前と就寝前	1013111000000000
	内服・経口・1日3回昼夕食後と就寝前	1013144000000000
1日4回	内服・経口・1日4回朝昼夕食前と就寝前	1014111100000000
	内服・経口・1日4回朝昼夕食後と就寝前	1014144400000000

薬品マスタ（HOT9）

薬品名	HOTコード
アドベイト静注用250	117697101
アドベイト静注用500	117697102
アボカイン皮下注30mg	121493201
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	124110501
エピベン注射液0.15mg	187047303
エンブレル皮下注50mgベン1.0mL	122427601
グランシリンジ150	114933303
ゴナビュール注用75	116986702
コンファクトF注射用250	111538304
コンファクトF注射用500	111539004
ノイトロジン注100μg	108197801
ノボセブンHI静注用5mg	119294001
ノボラビッド注100単位/mL	114565601
ヒューマリンN注100単位/mL	105466802
フォリスチム注75	187053402

注射・注入用法（JAMI標準用法規格）

用法	コード
注射・皮下注射・1日1回朝食前・ワンショット・在宅・自己	3211000100000014
注射・皮下注射・1日1回朝食後・ワンショット・在宅・自己	3211000400000014
注射・皮下注射・1日1回夕食前・ワンショット・在宅・自己	3211010000000014
注射・皮下注射・1日1回夕食後・ワンショット・在宅・自己	3211040000000014
注射・静脈注射・1日1回朝食前・ワンショット・在宅・自己	3011000100000014
注射・静脈注射・1日1回朝食後・ワンショット・在宅・自己	3011000400000014
注射・静脈注射・1日1回夕食前・ワンショット・在宅・自己	3011010000000014
注射・静脈注射・1日1回夕食後・ワンショット・在宅・自己	3011040000000014

8桁補足用法コード（JAMI標準用法規格）

	第1桁	第2桁	第3桁	第4桁	第5桁	第6桁	第7桁	第8桁
補足用法種別	補足用法区分	補足用法に関連する情報						
日付間隔指定	I	連続服用 日数	連続休薬 日数	0	0	0	0	0
曜日指定	W	服用有無 （日曜） 服用なし： 0 服用あり： 1	服用有無 （月曜） 服用なし： 0 服用あり： 1	服用有無 （火曜） 服用なし： 0 服用あり： 1	服用有無 （水曜） 服用なし： 0 服用あり： 1	服用有無 （木曜） 服用なし： 0 服用あり： 1	服用有無 （金曜） 服用なし： 0 服用あり： 1	服用有無 （土曜） 服用なし： 0 服用あり： 1
不均等	V	指定するタイミ ングの服用順	指定したタイミングの服用量 （数字0～9、小数点、Nを使用）					

マスタの種別とコーディングシステム名

種別	コーディングシステム名		利用フィールド
	共通コード	ローカルコード	
処方種別	MR9P	任意の値 (99<NNN>型で左記の 値と重複しないこと)	RXE-21
不均等指示	JAMISDP01		RXE-7
用法種別	JHSP0003		RXE-27
用法	JAMISDP01 HL70335		TQ1-3
経路	HL70162		RXR-1
部位	HL70550 JAMISDP01		RXR-2 RXR-6
薬品コメント	JHSIOB0031		RXE-7
処方せんコメント	JHSIOB0032		RXE-7
薬品	HOT		RXE-2
用量単位／総量単位	MR9P		RXE-5 RXE-11
保険種別	JHSD0001		IN1-2
診療科	99Z01		ORC-17
1日の中での服用開始タイミング	JHSP0005		RXE-7
服用実施タイミング	JHSP0006		RXA-9
実施コメント	99ZAC		RXA-9
用法コメント	セットしない	セットしない	TQ1-11

※ ローカルコードは必ずしもセットする必要はない